

本卡提供您在使用**諾骨盛®注射液**治療癌症相關疾病之前和期間所需要瞭解的重要安全性資訊。

版本 2.0 · 日期：2025/10/28
TW-26-0150



如果您出現任何副作用，請告訴您的醫生、藥師或護理師。包括本說明書中未收載的任何可能的副作用。

請將副作用通報至：

- 亞培藥品不良反應信箱 pv.tw@abbott.com
- 全國藥物不良反應通報系統 <https://adr.fda.gov.tw/>
電子信箱 adr@tdrf.org.tw 傳真: (02)2358-4100

藉由不良反應通報，您可幫助提供更多有關**諾骨盛®注射液**的安全性資訊。

您的醫生建議您接受諾骨盛®注射液治療，以幫助預防骨轉移或骨癌引起的骨併發症（例如骨折）。

在接受諾骨盛®注射液注射治療癌症相關疾病的患者中，曾通報一種常見（每 10 人中可能就有 1 人）的副作用 - 顎骨壞死 (Osteonecrosis of the jaw)。在停止治療後，顎骨壞死也可能發生。

預防顎骨壞死的發生非常重要，因為這可能是一種疼痛且難以治療的疾病。

為降低發生顎骨壞死的風險，您應該採取一些預防措施：

開始治療前：

- 請諮詢您的醫生是否需要進行牙科檢查。
- 如果您的口腔或牙齒有任何狀況，請主動告知您的醫生/護士（醫療保健專業人員）。

接受牙科手術（例如拔牙）、未接受常規牙齒護理或患有牙齦疾病、吸煙、高齡以及接受不同類型癌症治療的患者發生顎骨壞死的風險較高。

治療期間：

- 您應保持良好的口腔衛生，並接受常規牙科檢查。如果您配戴假牙，則應確保假牙合適。
- 如果您正在接受牙齒治療或將接受牙科手術（例如拔牙），請告知您的醫生並告訴您的牙醫您正在接受諾骨盛®注射液治療。
- 如果您的口腔或牙齒出現任何問題，例如牙齒鬆動、疼痛或腫脹、瘡無法癒合或有分泌物，請立即聯繫您的醫生和牙醫，因為這些可能是顎骨壞死的症狀。

更多詳情請參閱諾骨盛®注射液藥品仿單內容。