

更多詳情請參閱藥品附帶的藥品說明書。

如果您出現任何副作用，請告訴您的醫生、藥師或護理師。

請將不良反應通報至：

- 亞培藥品不良反應信箱 pv.tw@abbott.com
- 全國藥物不良反應通報系統 <https://adr.fda.gov.tw/>
電子信箱 adr@tdrf.org.tw 傳真: (02)2358-4100

藉由不良反應通報，您可幫助提供更多有關骨律欣預充填針筒注射液 60 毫克/毫升的安全性資訊。

本卡提供您在接受骨律欣®預充填針筒注射液 60 毫克/毫升治療之前和治療期間需要瞭解的重要安全性資訊。

版本 2.0 · 日期 2025/10/16
TW-26-0136



您的醫生建議您使用骨律欣®預充填針筒注射液 60 毫克/毫升，來治療骨質疏鬆症和骨質流失。這些疾病會導致骨骼變得薄弱，而容易發生骨折。

在接受骨律欣®注射液治療骨質疏鬆症的患者中，曾通報一種少見（每千人可能影響一人）的副作用 - 顎骨壞死(Osteonecrosis of the jaw)。在停止治療後，顎骨壞死也可能發生。預防顎骨壞死的發生非常重要，因為這可能是一種疼痛且難以治療的疾病。

為降低發生顎骨壞死的副作用，您應該採取以下的預防措施。

開始治療前：

- 請告知您的醫生/護士（醫療保健專業人員）您是否有任何口腔或牙齒的狀況。

- 如果您有以下情況，醫生可能會要求您接受牙科檢查：
 - ☐ 曾經使用過雙磷酸鹽藥物治療
 - ☐ 正在使用皮質類固醇藥物如 Prednisolone，Dexamethasone
 - ☐ 吸煙者
 - ☐ 癌症病人
 - ☐ 長期沒有做牙科檢查
 - ☐ 有口腔或牙齒的狀況

治療期間，請注意以下情況：

- 保持良好的口腔衛生，並接受常規牙科檢查。如果您配戴假牙，則應確保假牙合適。
- 如果您正在接受牙齒治療或將接受牙科手術（例如拔牙），請告知您的醫生和牙醫您正在接受骨律欣®注射液治療。
- 如果您的口腔或牙齒出現任何問題，例如牙齒鬆動、疼痛或腫脹、瘡無法癒合或有分泌物，請立即聯繫您的醫生和牙醫，因為這些情況可能是顎骨壞死的症狀。
- 這些可能是**顎骨壞死**的症狀。